

## SCHEMA DI INFUSIONE AMIODARONE

AMIODARONE (CORDARONE) 1 FL. = 150 mg. = 3 ml.

**SIRINGA 50 ml. = AMIODARONE 3 fl. ( 9 ml.) + GLUCOSIO 5% 41 ml.**

mg/24 h.	ml/h
800	3,7
900	4,2
1000	4,6
1100	5,1
1200	5,5
1300	6
1400	6,4
1500	6,9

Rev 1.0 24/01/05  
Inf M.Salvati AUSL Ferrara  
Inf A.Monesi AUSL Bologna

### INDICAZIONI

aritmie ipercinetiche ventricolari e sopraventricolari

### MODALITA' DI SOMMINISTRAZIONE

**Bolo** : 5 mg./kg. EV in 15/20 min. portato a 20 ml con gluc. 5% / **infusione continua**

### EFFETTI COLLATERALI E PRECAUZIONI D'USO

**Bradycardia; ipotensione; blocco SA o AV; allungamento del QT; distiroidismo;**

**Utilizzare con molta cautela in caso di tireopatia e BPCO**

**Utilizzare quando possibile accessi venosi centrali per prevenire tromboflebiti della sede di infusione periferica; se infuso per via periferica cambiare via d'infusione ogni 8 h., per prevenire complicanze tromboflebitiche**

**INCOMPATIBILE AL RUBINETTO CON DIVERSE SOLUZIONI E/O FARMACI (VEDI COMPATIBILITA')  
PERTANTO E' NECESSARIO NON AUMENTARE LA CONCENTRAZIONE SULLA LINEA VENOSA**

### CONTROINDICAZIONI

**gravidanza; allattamento; aritmie ipocinetiche**

### MONITORAGGIO

**FC; ECG; PA;**

### Note bibliografiche

LH Opie Drugs for the Heart, 1995, WB Saunders Company