

SCHEMA DI INFUSIONE PROPAFENONE IN POMPA A SIR.

PROPAFENONE (RYTMONORM) 1 FL. = 70 mg. = 20 ml.

INDICAZIONI

Aritmie ipercinetiche sopraventricolari

MODALITA' DI SOMMINISTRAZIONE

BOLO : 2 mg./kg. EV in 10 min., non diluito

INFUSIONE : 0,007mg/kg/min. per 2 h.(max. 3 h.)

SIRINGA 50 ml : PROPAFENONE 2 fl (=40 ml) + Sol. Fisiol. 0,9% (o glucosio 5%)10 ml

peso (kg)	ml/h.
40	6
50	7,5
60	9
70	10,5
80	12
90	13,5
100	15
110	16,5

Rev 1.0 24/01/05 Inf M.Salvati AUSL Ferrara Inf A.Monesi AUSL Bologna

EFFETTI COLLATERALI E PRECAUZIONI D'USO

Ipotensione; turbe della progressione dello stimolo; allungamento del PR e QRS;

Insuff. epatica; possibile effetto proaritmico

N.B. : sospendere l'infusione continua o il bolo, al ripristino del ritmo sinusale o alla fine del tempo prestabilito d'infusione

CONTROINDICAZIONI

Insuff. Cardiaca; bradicardia; turbe conduz. AV e IV; squilibri elettrolitici

MONITORAGGIO

FC; ECG; PA;

Note bibliografiche

Studio PAFIT 1

AHA 1998