Abciximab (Reopro)

0.25 mg/Kg in bolo seguita da infusione 0,125 μg/min secondo lo schema seguente.

BOLO ENDOVENA: Dalla siringa principale aspirare con una siringa da 10 ml la quantità di ReoPro necessaria per il bolo (vedere nomogramma), che andrebbe somministrato in 1 minuto.

INFUSIONE CONTINUA ENDOVENA: Aspirare 4 ml di ReoPro dalla siringa principale. Portare a volume con 50 ml di soluzione salina allo 0,9 %

Peso (Kg)	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
Bolo IV (ml)	6,2	6,4	6,5	6,6	6,8	6,9	7,0	7,1	7,2	7,4	7,5
Vel infus. (ml/h)	2,5	2,6	2,6	2,7	2,7	2,8	2,8	2,9	2,9	3,0	3,0
Peso(Kg)	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71
Bolo IV (ml)	7,6	7,8	7,9	8,0	8,1	8,2	8,4	8,5	8,6	8,8	8,9
Vel infus. (ml/h)	3,1	3,2	3,2	3,3	3,3	3,4	3,4	3,5	3,5	3,6	3,1
Peso (Kg)	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
Bolo IV (ml)	9,0	9,1	9,2	9,4	9,5	9,6	9,8	9,9	10,0	10,1	10,2
Vel infus. (ml/h)	3,6	3,7	3,7	3,8	3,8	3,9	3,9	4,0	4,0	4,0	4,0
Peso (Kg)	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93
Bolo IV ml)	10,4	10,5	10,6	10,8	10,9	11,0	11,1	11,2	11,4	11,5	11,6
Vel infus. (ml/h)	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Peso (Kg)	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104
Bolo IV (ml)	11,8	11,9	12,0	12,1	12,3	12,4	12,5	12,6	12,8	12,9	13,0
Vel infus. (ml/h)	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0